

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА*
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Антибактериальные средства

<p>Rp.: Tab. Ampicillini 0,25 D. t. d. N 24 S. По 1-2 таблетки 4-6 раз в день.</p>	<p>Rp.: "Bactrim" (suspensia) 100 ml D. S. По 1-2 чайной ложке 2 раза в день.</p>
<p>Rp.: Ampicillini-natrii 0,25 D. t. d. N 20 in lagenis S. Растворить в 1,5-2 мл воды для инъекций, вводить внутримышечно по 0,25 г 4-6 раз в день.</p>	<p>Rp.: Ampioxi natrii 0,5 D. t. d. N 20 in lagenis S. Растворить в 5 мл воды для инъекций, вводить внутримышечно по 0,5-1,0 г 3-4 раза в день.</p>
<p>Rp.: Cephalexini 0,25 D. t. d. N 30 in caps. S. По 1 капсуле 4 раза в день.</p>	<p>Rp.: "Biseptoli" 480 D. t. d. N 20 S. По 2 таблетки 2 раза в день после еды.</p>
<p>Rp.: Benzylpenicillini kalii 250 000 ED D. t. d. N 20 S. Растворить в стерильном изотоническом растворе натрия хлорида, вводить по 1-3 мл внутримышечно 6 раз в день.</p>	<p>Rp.: Carbenicillini-dinatrici 1,0 D. t. d. N 20 in lagenis S. Растворить содержимое флакона в 2 мл воды для инъекций, вводить внутримышечно по 1-2 г 4-6 раз в день.</p>
<p>Rp.: Dicloxacillini-natrii 0,25 D. t. d. N 20 in caps. S. По 2 капсулы 4 раза в день за 1 ч до или через 1,5 ч после еды.</p>	<p>Rp.: Cephaloridini 0,25 D. t. d. N 20 in lagenis S. Растворить содержимое флакона в 1 мл воды для инъекций, вводить внутримышечно или в вену 2 раза в день.</p>
<p>Rp.: Doxycyclini hydrochloridi 0,1 D. t. d. N 10 in caps gelat. S. По 0,2 г в день после еды.</p>	<p>Rp.: Tab. Erythromycini 0,25 D. t. d. N 30 S. По 1 таблетке 4-6 раз в день за 1,5-2 ч до еды.</p>
<p>Rp.: Tab. Furagini 0,05 D. t. d. N 30 S. По 1-2 таблетки 4 раза в день.</p>	<p>Rp.: Tab. Kanamycini monosulfatis 0,25 D. t. d. N 30 S. По 2 таблетки 4 раза в день.</p>
<p>Rp.: Tab. Fusidini-patrii 0,25 D. t. d. N 20 S. По 2 таблетки 3 раза в день с молоком или жидкой пищей.</p>	<p>Rp.: Tab. Laevomycetini 0,5 D. t. d. N 30 S. По 1 таблетке 4 раза в день</p>
<p>Rp.: Gentamycini sulfatis 0,08 D. t. d. N 10 in lagenis. S. Растворить содержимое флакона в 2 мл воды для инъекций, вводить внутримышечно по 1 мл 2-3 раза в день.</p>	<p>Rp.: Sol. Kanamycini sulfatis D. t. d. N 10 in ampull. 5 % 10,0 S. Растворить содержимое ампулы в 200 мл 5 % раствора глюкозы, вводить в вену капельно 2 раза в сутки.</p>

<p>Rp.: Kefzoli 0,5 D. t. d. N 20 in lagenis S. Растворить в 2 мл воды для инъекций, вводить внутримышечно или в вену 3-4 раза в день.</p>	<p>Rp.: Lincomycini hydrochloridi 0,25 D. t. d. N 20 in caps. S. По 1 капсуле за 1-2 ч до еды или через 2-3 ч после еды 2-3 раза в день.</p>
<p>Rp.: Tab. Levorini obductae 500 000 ED D. t. d. N 25 S. По 1 таблетке 4 раза в день.</p>	<p>Rp.: Tab. Monomycini 0,25 D. t. d. N 20 S. По 1 таблетке 4-6 раз в день.</p>
<p>Rp.: Methacyclini hydrochloridi 0,3 D. t. d. N 16 in caps. S. По 1 капсуле 2 раза в день во время или после еды.</p>	<p>Rp.: Monomycini 1,0 Vaselini Lanolini aa 25,0 M. f. unguentum D. S. Смазывать участки поражения на коже при кожном лейшманиозе.</p>
<p>Rp.: Morphocyclini 0,15 D. t. d. N 15 in lagenis S. Растворить в 20 мл 5 % раствора глюкозы, вводить в вену медленно 1-2 раза в день.</p>	<p>Rp.: Tab. Oxacillini-natrii 0,25 D. t. d. N 20 S. По 2 таблетки на прием 4-6 раз в день за 1 час до или через 2-3 часа после еды.</p>
<p>Rp.: Tab. Neomycini sulfatis 0,25 D. t. d. N 10 S. По 1 таблетке 2 раза в день.</p>	<p>Rp.: Tab. Phtalazoli 0,5 D. t. d. N 40 S. По 2 таблетки 4 раза в день.</p>
<p>Rp.: Tab. Phenoxyethylpenicillini 0,25 D. t. d. N 10 S. По 1 таблетке 6-8 раз в день за 30-60 мин до еды.</p>	<p>Rp.: Rifampicini 0,15 D. t. d. N 20 in caps. S. По 3 капсуле 1 раз в день за 30-60 мин до еды</p>
<p>Rp.: Rifamycini 0,25 D. t. d. N 20 in ampull. S. Растворить содержимое ампулы в 2 мл изотонического раствора натрия хлорида, вводить внутримышечно 2 раза в день.</p>	<p>Rp.: Streptomycini sulfatis 0,5 D. t. d. N 10 in lagenis S. Растворить содержимое флакона в 2 мл 0,5 % раствора новокаина, вводить внутримышечно 2 раза в сутки.</p>
<p>Rp.: Tab. Sulfadimethoxyini 0,5 D. t. d. N 20 S. 2-4 таблетки в 1-й день лечения в один прием, затем по 1 таблетке 1-2 раза в день.</p>	<p>Rp.: Tab. Sulfapyridazini 0,5 D. t. d. N 20 S. По 2-4 таблетки в 1-й день и по 1-2 таблетки в день в последующие дни.</p>
<p>Rp.: Tab. Sulfadimezini 0,5 D. t. d. N 30 S. По 2 таблетки 4-6 раз в день.</p>	<p>Rp.: Tab. "Sulfatonum" 0,5 D. t. d. N 20 S. По 1 таблетке 2 раза в день.</p>
<p>Rp.: Tab. Tetracyclini obductae 0,25 D. t. d. N 20 S. По 1 таблетке 4 раза в день после еды</p>	<p>Rp.: Tetracyclini hydrochloridi 0,1 D. t. d. N 12 in leganis S. Растворить содержимое флакона в 2,5 мл 1 % раствора новокаина, вводить внутримышечно 2 раза в сутки.</p>

Противовирусные средства

Rp.: "Interferoni leucocytici" D. t. d. N 10 in ampull S. Содержимое ампулы растворить в 2 мл воды, закапывать в нос по 5 капель 5-8 раз в день.	Rp.: Ung. Oxolini 0,25 % 10,0 D. S. Для смазывания слизистой оболочки носа 2 раза в день.
Rp.: Tab. Methisazoni 0,2 D. t. d. N 25 S. По 3 таблетки 2 раза в день.	Rp.: Ung. Bonaphtoni 0,05 % 10,0 D. S. Глазная мазь, закладывать за веки.
Rp.: Tab. Bonaphtoni 0,1 D. t. d. N 50 S. По 1 таблетке 3 раза в день через 1 ч после еды.	Rp.: Tab. Remantadini 0,05 D. t. d. N 20 S. По 2 таблетки 3 раза в 1-й день, затем по 2 таблетки в день.
	Rp.: Tab. "Zidovudin" 0,1 D. t. d. N 100 S. По 1-2 таблетки 4-5 раз в день.

Противопротозойные средства

Rp.: Tab. Aminichinoli 0,05 D. t. d. N 50 S. По 2-3 таблетки 3 раза в день после еды.	Rp.: Tab. Metronidazoli 0,25 D. t. d. N 20 S. По 1 таблетке 3-4 раза в день.
Rp.: Tab. Chingamini 0,25 D. t. d. N 50 S. По 4 таблетки на прием однократно и через 6-8 час еще 2 таблетки (в 1-й день); по 2 таблетки на прием в последующие 2 дня лечения.	Rp.: Sol' Emetini hydrochloridi 1 % 1,0 D. t. d. N 20 in ampull. S. Вводить внутримышечно по 1,5-2 мл 2 раза в день.
Rp.: Tab. Chinini hydrochloridi 0,5 D. t. d. N 20 S. По 1 таблетке 2 раза в день (при малярии 2 г в сутки).	Rp.: Tab. Primachini diphosphatis 0,009 D. t. d. N 30 S. По 1 таблетке 3 раза в день.
Rp.: Tab. Chinocidi obductae 0,01 D. t. d. N 50 S. По 1 таблетке 3 раза в день.	Rp.: Tab. "Tindurinum" 0,025 D. t. d. N 30 S. По 1 таблетке 2-3 раза в день.
Rp.: Tab. Chloridini 0,01 D. t. d. N 30 S. По 1 таблетке 3 раза в день.	Rp.: Tab. Tinidazole 0,5 D. t. d. N 4 S. По 4 таблетки 1 раз в день.
	Rp.: Tab. Trichopolium 0,25 D. t. d. N 20 S. По 1 таблетке 3-4 раза в день.

Антигельминтные средства

Rp.: Tab. Combantrini 0,25 D. t. d. N 3 S. По 1 таблетке после завтрака.	Rp.: Tab. "Pyrantelum" 0,25 D. t. d. N 3 S. 3 таблетки разжевать после завтрака.
Rp.: Tab. "Decaris" 0,15 D. S. По 1 таблетке на прием после ужина.	Rp.: Tab. Levamizoli 0,15 D. S. 1 таблетка после ужина (разжевать).
Rp.: Diphezyli 1,0 D. t. d. N 20 S. Порошки размешать в сахарном сиропе или воде, принимать за 1 ч до еды (5 порошков в день) (1+2 +1) в течение 5 дней.	Rp.: Tab. "Vermox" 0,1 D. t. d. N 6 S. По 1 таблетке на прием (при полиинвазии 1 таблетка 2 раза в день или 1 таблетка 3 дня подряд).
Rp.: Extr. Filicis maris spissi 0,5 D. t. d. N 14 in caps, gelat. S. Принимать в течение 30 мин 10-14 капсул, запивая водой.	

Иммуноглобулины, сыворотки

Rp.: Immunoglobulini normale humanum 3,0 D. t. d. N 3 in ampull. S. Вводить внутримышечно по 0,75-1,5 мл, по показаниям повторно.	Rp.: Immunoglobulini antileptosirosi 5,0 D. t. d. N 10 in ampull. S. Вводить внутримышечно по 5-10 мл, по показаниям повторно, после определения чувствительности к чужеродному белку.
Rp.: Immunoglobulini humani contra influenzae-gripp 3,0 D. t. d. N 6 in ampull. S. Вводить внутримышечно по 3 дозы, по показаниям повторно.	Rp.: Seri antidiphtherici concentrati depurati "Diaferm" 10 000 ME D. t. d. N 10 S. Вводить внутримышечно; в тяжелых случаях - в вену по схеме.
Rp.: Immunoglobulini antitetanici humani 3,0 D. t. d. N 10 in ampull. S. Вводить внутримышечно по 3 мл для профилактики, лечебная доза 10 тыс. ME в 1-й день, 5 тыс. ME в последующие 2 дня.	Rp.: Sol. Prodigiosani 0,005 % 1,0 D. t. d. N 6 in ampull. S. Вводить внутримышечно по 0,5-0,6 мл 1 раз в 7 дней.
Rp.: Immunoglobulini antirabicum humani 3,0 D. t. d. N 3 in ampull. S. Вводить внутримышечно по 160 ME/кг для экстренной профилактики бешенства.	Rp.: Pyrogenali 25 мкг D. t. d. N 10 in ampull. S. Вводить внутримышечно 1 раз в 3-4 дня в постепенно возрастающих дозах (по схеме).
Rp.: Immunoglobulini contra encephaliticum ixodicum 3,0 D. t. d. N 3 ampull. S. Вводить внутримышечно по 1,5-3 мл при укусе иксодовых клещей.	Rp.: Thymalini 0,01 D t. d. N 10 in lagenis S.: Содержимое флакона развести в 1-2 мл изотонического раствора натрия хлорида, вводить внутримышечно по 10-30 мг ежедневно в течение 5-20 дней.

	Rp.: Sol. tactivini 0,01 % 1,0 D. t. d. N 10 in lagenis S.: Вводить внутримышечно по 1 мл по схеме.
--	---

* Указаны основные препараты, приведенные в учебнике

Источник: Шувалова Е. П. Инфекционные болезни: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1990. -560 с.: ил. (Учеб. лит. для студ. мед. ин-тов).